

INFORMATION**Tabletten mit 2C-B**

August 2019

2019 als 2C-B zur Analyse gebracht (Auswahl):**Logo: Mickey Mouse**
Gewicht: 100,3 mg
7,4 mg 2C-B**Logo: Cornetto**
Gewicht: 224,7 mg
15,3 mg 2C-B**Logo: Yoshi**
Gewicht: 200,6 mg
15,8 mg 2C-B**Logo: Mojo Jojo**
Gewicht: 134,6 mg
3,1 mg 2C-B**Logo: Homer Simpson**
Gewicht: 350,5 mg
10,0 mg 2C-B**Logo: Wikinger**
Gewicht: 478,9 mg
150 mg MDMA (!!)

Im Jahr 2019 wurden bei der Drogenarbeit Z6 vermehrt Tabletten mit 2C-B zur Analyse gebracht.

2C-B ist ein Meskalin-Derivat mit halluzinogener Wirkung. Da der Wirkungseintritt bis zu 60 Minuten dauern kann, besteht die **Gefahr früher Nachzulegen und so ein hohe Dosis zu konsumieren**. 2C-B wirkt schon in kleinen Mengen psychoaktiv, **ab 10 mg 2C-B stellt sich eine halluzinogene Wirkung ein. Bereits 2 mg mehr können die Wirkung massiv verstärken**. Da der Wirkstoff in Tabletten nicht gleichmäßig verteilt ist, **gestaltet sich das Dosieren bei Tabletten noch schwieriger**.

Tabletten mit dem gleichen Erscheinungsbild (Logo, Größe, Farbe und Gewicht) können trotzdem **unterschiedliche Dosierungen und andere Wirkstoffe aufweisen!!**

Es besteht Verwechslungsgefahr mit XTC-Tabletten! Wer eigentlich eine Ecstasy-Wirkung erwartet, hat möglicherweise Probleme, eine psychedelische Wirkung zu akzeptieren. Das kann Angst- und Panikattacken auslösen.

Aufgrund der Verwechslungsgefahr mit XTC-Tabletten wird empfohlen, Tabletten unbedingt testen zu lassen!



DROGENARBEIT Z6 – Drug Checking

Dreiheiligenstrasse 9 | 6020 Innsbruck
+43 699 11 86 96 76
drugchecking@drogenarbeitz6.at | www.drogenarbeitz6.at
ZVR-Zahl: 445057252

Informationen zu 2C-B

Dosierung: geschnupft (Pulver) 2 bis max. 15 mg, geschluckt (Tabletten) 5 bis max. 45 mg. 2C-B wirkt schon in kleinen Mengen. Man sollte sich daher nur in kleinen Schritten an seine individuelle Dosis herantasten. Dosierungen über 35 mg können auch von erfahrenen User*innen als unangenehm stark empfunden werden.

Wirkungseintritt: geschluckt nach 30-60 Minuten, geschnupft 5-10 Minuten.

Wirkungsdauer: 4-8 Stunden.

Die typische 2C-B Wirkung wird oft als eine Kombination der Effekte von LSD und MDMA beschrieben, was aber nur bedingt zutrifft. 2C-B wirkt weniger dissoziativ (= Geist wird abgespalten von Körper und/oder Umwelt erlebt) als LSD oder ähnliche Halluzinogene. Im Vergleich zu MDMA ist die Wirkung weniger vorhersehbar und nicht unbedingt positiv gefärbt. 2C-B kann zu leichter Euphorie, Heiterkeit und verstärktem Lachreiz führen, Wahrnehmung und Körperempfindsamkeit sind intensiviert.

Unsicherheit, Angst, Besorgnis, Orientierungslosigkeit und Verwirrung können vor allem bei höheren Dosen auftreten. User*Innen berichten von Übelkeit, Magenbeschwerden, Durchfall, Krämpfen und Blähungen. Nach dem Konsum kommt es zu einem Anstieg des Blutdrucks und der Körpertemperatur sowie einer beschleunigten Herzfrequenz.

Es kann davon ausgegangen werden, dass mögliche negative Langzeitfolgen mit jenen anderer Halluzinogene vergleichbar sind. Veränderte Wahrnehmung, besonders intensives Erleben und Erlebnisse können Angst, Panik und Verwirrung auslösen. Bei anfälligen Personen kann der Konsum psychische Krankheiten wie Angsterkrankungen, Schizophrenie und Depressionen auslösen.

Achte bei Halluzinogenen wie 2C-B besonders auf die **Dosierung** (taste dich langsam an die Dosierung und Wirkung heran) sowie auf **Set** und **Setting!**

Konsumiere nur, wenn du es wirklich willst, du dich wohl und sicher fühlst!

Beachte die Safer Use Regeln!! (<https://www.drogenarbeitz6.at/konsum/safer-use.html>)

- Nimm max. die Hälfte einer Tablette und warte mind. 2 Stunden, um die Wirkung zu erfahren.
- Verzichte auf Mischkonsum (auch mit Alkohol, Energydrinks oder Cannabis), da es zu unberechenbaren Wechselwirkungen kommen kann.
- Achte auf die Bedürfnisse deines Körpers: Trink' Wasser & mach' Pausen an der frischen Luft.

Quellen: www.checkyourdrugs.at, www.saferparty.ch

